

Znieczulenie dożyłne

W trakcie znieczulenia dożylnego chory poprzez kaniulę wprowadzoną do żyły obwodowej otrzymuje leki przeciwbólowe, nasenne oraz przeciwlękowe. Powodują one czasowe ograniczenie a czasami wyłączenie świadomości chorego oraz zablokowanie odczuwania bólu w trakcie przeprowadzanego zabiegu endoskopowego. Pozwala to pacjentowi na uniknięcie dyskomfortu związanego z przeprowadzanym badaniem endoskopowym. W trakcie całego okresu znieczulenia chory znajduje się pod bezpośrednim nadzorem lekarza anestezjologa oraz pielęgniarki anestezjologicznej, którzy stale monitorują jego parametry życiowe: ciśnienie tętnicze, czynność pracy serca, saturację krwi tętniczej oraz częstość oddechu. W trakcie całego znieczulenia chory ma suplementowany tlen poprzez wąsy tlenowe co ma zapobiec niebezpiecznym dla zdrowia spadkom utlenowania krwi. Po zakończeniu zabiegu chory jest przewożony do sali pozabiegowej, gdzie pozostaje do czasu, kiedy jest stan ogólny, pozwala na opuszczenie placówki medycznej w asyście osoby drugiej. Chory nie może samodzielnie opuścić gabinetu, ponieważ na skutek szczątkowego działania podawanych w trakcie badania leków ma zaburzone poczucie postrzegania rzeczywistości w okresie do 12 godzin po znieczuleniu.

Przygotowanie pacjenta bezpośrednio do znieczulenia:

- chory może pić wodę niegazowaną do 2 godzin przed znieczuleniem, nie może przyjmować żadnych pokarmów w okresie 6 godzin przed znieczuleniem;
- zaleca się niepalenie papierosów przed zabiegiem;
- osoby z chorobami przewlekłymi przyjmujące codziennie leki powinny je przyjąć w dniu zabiegu zgodnie z codziennym harmonogramem popijając niewielką ilością wody (nie dotyczy do leków na cukrzycę);
- chorzy na cukrzycę przyjmujący doustne leki hipoglikemizujące lub insulinę w dniu zabiegu nie mogą ich przyjmować;
- chorzy przyjmujący takie leki jak: ozempic, rybelsus, wegovy saxenda, victoza, mounjaro i trulicity powinni odstawić je na 7 dni przed zabiegiem (niezależnie od tego czy przyjmują tabletki czy zastrzyki);
- pacjenci powinni zgłosić się do zabiegu bez makijażu, pomalowanych paznokci, hybrydy powinny być usunięte z palca wskazującego lub serdecznego, a kosztowności i biżuteria powinna pozostać w domu.

Ryzyko znieczulenia

Z każdym znieczuleniem wiąże się ryzyko powikłań. W przypadku znieczulenia dożylnego, przestrzegając wymienionych powyżej zasad, ryzyko groźnych dla życia powikłań jest znikome i jest związane z ogólnym stanem zdrowia pacjenta, jego obciążeniami zdrowotnymi oraz rodzajem wykonywanego zabiegu.

Zasady postępowania po znieczuleniu

Chory może opuścić placówkę medyczną tylko pod opieką osoby dorosłej. Do 12 godzin po znieczuleniu pacjent nie może:

- pić alkoholu;
- prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać skomplikowanych urządzeń i maszyn;
- wykonywać czynności wymagających 100 % sprawności fizycznej i psychicznej;
- podejmować ważnych decyzji osobistych i zawodowych.

Data

czytelny podpis Pacjenta